

DEIKRA MAT 35

(Thermometer verwenden) Anrührtemperatur: 40-45°C
Tränketemperatur: 38-39°C

Milchautsach-Aleinfuttermittel für Aufzuchtkäiber

Analytische Bestandteile:

21,50 %	Rohtprotein	18,00 %	Rehtett	0,20 %	Rohtfaser
7,70 %	Rohtasche	1,05 %	Calcium	0,70 %	Phosphor
0,50 %	Natrium	25000,00	IE/kg Vitamin A		

Zusammensetzung: Enthält 35% Magermilchpulver

Magermilchpulver, Molkenpulver, Pflanzenfett rat. (Palm/ Kokos), Molkenpulver teilentzuckert, Weizenproteinkonzentrat hydrolisiert

Zusatzstoffe je kg Mischfutter: Ernährungshysiologische Zusatzstoffe:

Vitamin A (3a672a)	18.000 I.E.	Vitamin D3 (3a671)	5.250 I.E.
Vitamin E all	100 mg	Vitamin C (3a300)	150 mg
rac-Alpha-Tocopherylacetat (3a7001)			

Verbindung von Spurenelementen:


Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat (3b103)	50 mg	Eisen als Eisen-(II)-Glycinohetat-Hydrat (3b108)	50 mg
Kupfer als Kupfer-(II)-Glycinohetat-Hydrat (3b413)	4 mg	Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605)	64 mg
Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503)	64 mg	Selen als Natriumselenit (3b801)	0,3 mg
Iod als Calciumjodid, wasserfrei (3b202)	0,16 mg		

Technologische Zusatzstoffe: Calciumpropionat (1a282) 300 mg, Calciumformiat (1a238) 7.000 mg, BHT (E321) 17,34 mg, BHA (1b320) 0,18 mg, Propylgallat (E310) 0,08 mg,

Zootechnische Zusatzstoffe 1,8 Mgd, KBE Enterococcus faecium M74 @ (NCIMB11811), EC id Nummer 4b 1708-PUCOFEMU

Anerkennungs-Nr. alpha DE-BY-1-00071
Kennnummer der Partie: 150
Herstelldatum: 05/2025
Handar nach Herstellung mind. Monate: 9
Netto Masse: 25 kg

VLOG gepüff



Hinweis: Mindesthaltbarkeitsdauer setzt ordungsgemäße und handelsübliche Aufbewahrung voraus. Dazu gehört insbesondere hygienische Kühe und trockene Lagerung

Inverkehrbringer: DEIKRA-Futter GmbH

DEIKRA
FUTTER
Mühlstraße 4 86470 Thannhausen
Tel. 0821/2058 www.info@deikra-futter.de

Klassischer Tränkeplan : Aufzucht

1. - 2. Tag:	MAT-Konzentration (g/l)* = 110	Menge: 5 Liter auf 6 Liter- erhöhen
3. - 21. Tag:	MAT-Konzentration (g/l) = 110-125	Menge: 6 Liter
21. - 35. Tag:	MAT-Konzentration (g/l) = 125	Menge: linear abnehmend von 6 auf 4 Liter
36. - 53. Tag:	MAT-Konzentration (g/l) = 125	Menge: linear abnehmend von 4 auf 2 Liter
53. - 63. Tag:	MAT-Konzentration (g/l) = 125	Menge: linear abnehmend von 2 auf 0 Liter
≈ 30 kg MAT/Kalb		

Oben angegebene Tränkemengen sind auf zwei Mahlzeiten zu verteilen. Ab der 1. Lebenswoche Heu und Kraftfutter zur freien Aufnahme anbieten, jedoch nicht mehr als 2 kg. Kraftfutter je Tier/Tag verabreichen. Wasser muss den Tieren ab der 2.Lebenswoche zur freien Aufnahme zur Verfügung stehen.

Eine Tränkekonzentration in der frühen Aufzuchtphase von 160 g MAT/liter Wasser anstuf 125 g/liter in den ersten Lebenswochen führt zu einer verbesserten Wachstumsleistung.
→ Metabolische Programmierung

Beispiel für eine Aufzucht gemäß der „metabolischen Programmierung (mit mind. 20% WMP)

1. - 28. Tag:	MAT-Konzentration (g/l)* = 160	Menge: 6 Liter
29. - 31. Tag:	MAT-Konzentration (g/l) = 160-120	Menge: 6 Liter
31. - 63. Tag:	MAT-Konzentration (g/l) = 120	Menge: linear abnehmend von 6 auf 2
≈ 44 kg MAT/Kalb		

(Quelle: Empfehlungen zur Tränke von jungen Aufzuchtkälbern mit Milchautsachsystem (DLG-Arbeitskreis: Futtermittelung))

*Anmerkung zu g/L:

1000ml (=1liter fertige Tränke) / Menge Pulver in Gramm = benötigte Menge Wasser in ml

Beispiel:
160g Pulver + 840 ml Wasser = 1 liter fertige Tränke
150g Pulver + 850 ml Wasser = 1 liter fertige Tränke
120g Pulver + 880 ml Wasser = 1 liter fertige Tränke

Wichtig! Nur frisch zubereitete Tränke verfüttern, da Tränkereste leicht ansauer werden können!

Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eines!) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

Fütterungshinweis: Dieses Futter darf nur an Kälber bis zu einem Alter von 6 Monaten verfüttert werden.



pastus* AMA-Gütesiegel tauglich